

RENDIDOR F1 Tomate Tipo Chonto



Estados de Desarrollo

Días a germinación	Días a Transplante	Inicio a cosecha (DDT)
4 a 8	22 a 30	75 a 85

Descripción del Fruto

Forma	Longitud (cm)	Peso (g)	Postcosecha	Color en maduración	Clase de crecimiento
Cuadrado	5 a 8	120 - 160	Buena	Rojo Intenso	Indeterminado

Adaptabilidad

Clima o Piso Térmico	Densidad de Siembra
Cálido Medio Frio Medio	15.000 a 25.000

Comportamiento Fitosanitario

Abreviatura	Problema Fitosanitario	Agente Causal	Nivel de Tolerancia
V (1)	Marchitamiento por Verticillium	V. dahliae, V.albo-atrum	Alta (Datos Suministrados por el proveedor)
Fol (1, 2,)	Marchitamiento por Fusarium	Fusarium oxysporum	
N	Nemátodos	M. incognita, arenaria, javanica	
ToMV	Virus del mosaico del tomate	Virus del mosaico del tomate	
TSWV	Virus del bronceado del tomate	Virus del bronceado del tomate	

Características

Planta de crecimiento indeterminado, con buenvigor, excelente cobertura; frutos tipo santa clara, con excelente comportamiento en poscosecha; de buen tamaño (120 a 160gramos) desde el comienzo hasta el final de la cosecha.

Presentación

Sobre de 1.000 semillas

La información contenida en este folleto, fue obtenida después de la realización de ensayos de campo. Los resultados pueden variar de acuerdo con la región, el clima, el sistema de siembra, etc.