

BÚFALO F1 Tomate Chonto



Estados de Desarrollo		
Días a germinación	Días a Transplante	Días Inicio a cosecha (DDT)
4 a 8	22 a 30	75 a 85

Descripción del Fruto				
Forma	Peso (g)	Postcosecha	Color en maduración	Clase de crecimiento
Cuadrado con hombros redondeados	130 - 185	Excelente	Rojo	Indeterminado

Adaptabilidad		
Área fría moderada (1800 a 2200 msnm)	80 - 85 DDT	Densidad de siembra 15.000 a 25.000
Área cafetera (1200 a 1800 msnm)	75 - 80 DDT	
Valle geográfico del río Cauca: (0-1200 msnm)	70 - 75 DDT	

RESISTENCIAS/TOLERANCIAS

V: Verticillium wilt, **FF:** Fusarium wilt raza 1 Y 2, **N:** Root knot nematode, **T:** Tomato Mosaic Virus
Sw: Tomato Spotted wilt, **Ty:** Tomato Yellow Leaf Curl Virus

CARACTERÍSTICAS

Planta de crecimiento indeterminado, con buen vigor, excelente cobertura; frutos tipo santa clara, con excelente comportamiento en poscosecha, de buen tamaño desde el comienzo hasta el final de la cosecha.

PRESENTACIÓN Sobre de 1.000 Semillas

La información contenida en este folleto, fue obtenida después de la realización de ensayos de campo. Los resultados pueden variar de acuerdo con la región, el clima, el sistema de siembra, etc.